

**Aufgabe 1 (4 Punkte):** Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und  $U$  ein Untervektorraum von  $V$ . Für  $v \in V$  sei  $v + U := \{v + u \mid u \in U\}$ . Zeigen Sie:

- (i) Sind  $v_1, v_2 \in V$  mit  $v_1 - v_2 \in U$ , so gilt  $v_1 + U = v_2 + U$ .
- (ii) Sind  $v_1, v_2 \in V$  mit  $v_1 - v_2 \notin U$ , so gilt  $(v_1 + U) \cap (v_2 + U) = \emptyset$ .
- (iii) Die Teilmenge  $v + U$  von  $V$  ist genau dann ein Untervektorraum, wenn  $v \in U$  gilt.

**Aufgabe 2 (4 Punkte):** Es sei  $K$  ein Körper,  $V$  ein  $K$ -Vektorraum und  $I$  eine Menge. Für jedes Element  $i \in I$  sei  $A_i$  eine Teilmenge von  $V$ . Die Familie  $(A_i)_{i \in I}$  von Teilmengen von  $V$  genüge der folgenden Bedingung: Zu je zwei Elementen  $i, j \in I$  existiere ein Element  $k \in I$  mit  $A_i \cup A_j \subseteq A_k$ . Zeigen Sie, dass in diesem Fall

$$\left\langle \bigcup_{i \in I} A_i \right\rangle = \bigcup_{i \in I} \langle A_i \rangle$$

gilt, dass diese Aussage aber ohne die obige Voraussetzung an die Familie  $(A_i)_{i \in I}$  im Allgemeinen falsch ist.

**Aufgabe 3 (4 Punkte):** Für welche Elemente  $t \in \mathbb{R}$  sind die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ t \\ 11 \end{pmatrix}$$

linear unabhängig? Stellen Sie im Fall  $t = 0$  den Vektor

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ 19 \end{pmatrix}$$

als Linearkombination der obigen drei Vektoren dar.

**Aufgabe 4 (4 Punkte):**

- (i) Es sei  $n \geq 1$  eine natürliche Zahl und  $\mathbb{Z}^n \subset \mathbb{Q}^n$  die Teilmenge aller Vektoren mit ganzzahligen Einträgen. Es sei  $A \subseteq \mathbb{Z}^n$  eine Teilmenge mit der Eigenschaft, dass sich jedes Element von  $\mathbb{Z}^n$  als *ganzzahlige* Linearkombination der Elemente von  $A$  darstellen lässt, d.h. als  $\sum_i \alpha_i v_i$  mit  $\alpha_i \in \mathbb{Z}$ ,  $v_i \in A$ . Zeigen Sie, dass  $A$  ein Erzeugendensystem des  $\mathbb{Q}$ -Vektorraumes  $\mathbb{Q}^n$  ist.
- (ii) Betrachten Sie im Fall  $n = 2$  die Teilmenge  $A := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{Z}^2$ . Zeigen Sie, dass  $A$  ein Erzeugendensystem von  $\mathbb{Q}^2$  ist. Lässt sich jedes Element von  $\mathbb{Z}^2$  als *ganzzahlige* Linearkombination der Elemente von  $A$  darstellen?